



مرکز آموزشی-درمانی و پژوهشی امام خمینی (ره) سراب

مراقبت از کاتتر دیالیز خونی (گروه هدف: بیماران)



تهیه و تنظیم :

رقیه فخری (سوپر وایزر آموزش سلامت)

و

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) سراب

سال ۱۴۰۱

لخته ممکن است داخل مجرای کاتتر یا بیرون کاتتر تشکیل شود و مسیر را مسدود کند. این وضعیت سرعت جریان خون کاتتر را کم می کند و کیفیت دیالیز را کاهش می دهد.

عفونت می تواند حتی با سرعت جریان خوب خون هم ایجاد شود.

مهم است که آموزش های مراقبتی کاتتر را دقیقاً همانطور که آموخته اید، اجرا کنید تا از عفونت پیشگیری کنید. شما باید علائم و نشانه های عفونت کاتتر را بشناسید و آنها را به پزشک خود یا پرستار دیالیز خود هر چه سریع تر گزارش کنید تا درمان مناسب در اولین فرصت انجام شود. علائم و نشانه های عفونت کاتتر عبارتند از :

- قب
- لرز
- ترشح از محل خروج کاتتر
- احساس ضعف و بیحالی عمومی

منابع مورد استفاده

-پرستاری داخلی جراحی برونزوسودارت ۲۰۱۴

بپوشانید. پرسنل نیز موقع تعویض پانسمان کاتتر شما باید ماسک بزنند و دستکش بپوشند.

• در پوش ها و کلمپ های کاتتر شما وقتی برای دیالیز استفاده نمی شوند باید کاملاً بسته نگه داشته شوند. فقط اعضای تیم مراقبتی باید از کاتتر دیالیز شما برای بیرون کشیدن خون یا دادن دارو یا مایعات استفاده کنند.

• اگر احساس کنید که محل اطراف کاتتر زخمی شده یا قرمز به نظر می رسد فوراً با پرستار دیالیز تماس بگیرید. در مورد علائم و نشانه هایی که باید فوراً مورد توجه قرار دهید از پرسنل دیالیز سوال کنید.



کاتتر دیالیز که داخل ورید گردن قرار دارد

آیا باید در مورد کاتتر نگران باشم؟

گاهی اوقات، حتی زمانی که شما خیلی موازنید و دقت می کنید، کاتتر شما ممکن است لخته کند یا عفونی شود

چگونه از کاتتر مراقبت کنیم؟

با مراقبت خوب، کاتتر بیشتر عمر می‌کند و شما از مشکلاتی مثل عفونت و تشکیل لخته در امان خواهید

ماند. نکات مهم زیر را پیش بگیرید

• پانسمان کاتتر را تمیز و خشک نگهدارید

• اطمینان حاصل کنید که محل ورود کاتتر تمیز

است و تیم مراقبت شما پانسمان آن را در هر

جلسه دیالیز عوض می‌کند

• یک سنت پانسمان در منزل داشته باشید تا در

صورت نیاز به تعویض پانسمان از آن استفاده کنید

از پرسنل دیالیز بخواهید تا چگونگی تعویض

پانسمان را در شرایط اورژانس به شما یاد بدهند

• درپوش کاتتر را هرگز برندارید. هوا نباید وارد

کاتتر شود.

• از شنا کردن یا قرار گرفتن در وان حمام بپرهیزید

نباشد اجازه دهید که محل کاتتر یا پانسمان کاتتر

خیس شود. رطوبت، باعث عفونت می‌شود

می‌توانید دوش بگیرید و روی پانسمان را طوری

بپوشانید که خیس نشود

• هر بار که درپوش کاتتر باز می‌شود، برای

جلوگیری از ورود باکتری به کاتتر و جریان خونتان، روی بینی و

دهان خود را با ماسک

اماگاهی شرایطی وجود دارد که مانع ایجاد فیستول یا گرافت می‌شود و لازم است از کاتتر به عنوان راه دائمی استفاده شود.

- افزایش دمای پا

- تورم یک طرف عضله پشت ساق پا، قوزک، ران و از قوزک به

پایین

- تب خفیف

- درد در پاها والتهاب و قمزی

- بروجسته شدن رگهای سطحی پا

کاتتر همودیالیز چیست؟

کاتتر مورد استفاده برای دیالیز معمولاً یک کاتتر تونلی

است زیرا زیر بوست قرار داده می‌شود. کاتترها عموماً

برای شرایط اورژانس و دوره‌های کوتاه مدت (تا سه

هفت‌هه) استفاده می‌شوند اما در شرایط زیر می‌توان

بیشتر از سه هفته از کاتترها برای دیالیز استفاده کرد:

• زمانی که فیستول یا گرافت شریانی وریدی ایجاد

شده اما هنوز برای استفاده آماده نیست

• زمانی که راه دیگری برای دسترسی دائمی

عروقی وجود ندارد. برای مثال، وقتی عروق

خونی بیمار به اندازه کافی برای ایجاد فیستول یا

گرافت قوی و مناسب نیستند.

کاتترها دو راه دارند یکی قرمز (شریانی) که خون را از

ورید شما بیرون می‌آورد و وارد دستگاه دیالیز می‌کند

و راه دیگر آبی رنگ (وریدی) است که اجازه می‌دهد.

کاتتر همودیالیز

مواقبت از کاتتر دیالیزی

زمانی که کلیه‌ها از کار می‌افتد و نمی‌توانند خون شما را

تصفیه کنند و آب و مواد زائد را از بدن تان دفع کنند، دیالیز

خونی به عنوان یک راه درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راه دسترسی عروقی دیالیزخونی، راه رساندن خون شما به

دستگاه دیالیز می‌باشد.

برای دیالیز سه راه دسترسی عروقی وجود دارد و شما

احتمالاً یکی از این‌ها را دارید:

• فیستول شریانی - وریدی که با اتصال یک شریان و ورید

مجاور هم در دست شما ایجاد می‌شود.

• گرافت شریانی - وریدی که با استفاده از یک لوله نرم

شریان و ورید دست شما به هم متصل می‌شوند.

• کاتتر که لوله نرمی است که در یکی از وریدهای

بزرگ، معمولاً در رگ گردن، قرارداده می‌شود.

فیستول شریانی - وریدی انتخاب ارجح و گرافت

شریانی - وریدی انتخاب بعدی برای دسترسی عروقی

دائمی است. کاتتر برای دسترسی موقتی توصیه می‌شود.

